

MANAGEMENT HYPOGLYKÉMIE U ASYMPTOMATICKÝCH RIZIKOVÝCH NOVOROZENCŮ (≥35+0)

normoglykémie: ≥ 2,6 mmol/l v prvních 48 hodinách života; ≥ 3,3 mmol/l po 72. hodině života

35+0 - 35+6

SGA (< 10. hmotnostní percentil)

děti matek s DM I. a II. typu

děti matek s GDM (inzulin, PAD)

36+0 - 36+6

LGA (> 95. hmotnostní percentil)

děti matek s GDM na dietě

iniciace stravy během 1. hodiny života - kojení + dokrm 2-4 ml/kg

glykémie 2 hodiny po krmení

screening pouze při kombinaci rizik či výskytu dalších rizikových faktorů (porucha poporodní adaptace, dechová tíseň, infekce, šok, polycytémie...)

GLYKÉMIE

< 1,5 mmol/l

1,5 - 1,9 mmol/l

2,0 - 2,5 mmol/l

≥ 2,6 mmol/l

nakrmit ihned,
glykémie za 1 hodinu

krmení á 2-3 hodiny,
glykémie za 2-3 hodiny

krmení á 3 hodiny,
glykémie za 6-12 hodin

2 glykémie < 2 mmol/l

2-3 glykémie < 2,5 mmol/l

krmení + i.v. 10% glukóza (5 mg/kg/min = 3 ml/kg/h)

ukončení screeningu
2 preprandiální glykémie
≥ 2,6 mmol/l

dále krmení á 3 hodiny