

ALGORITMUS TERAPIE NAS



riziková anamnéza matky
anamnéza návykové látky
klinický stav novorozence

FS 2 hod. po porodu nebo hned dle kliniky
+ zahájení konzervativní léčby
+ odběr moče matky, smolka (moč) dítěte na toxikologii
+ dle kliniky laboratorní vyšetření novorozence

FS > 8 bodů

FS á 2-3 hod.

2-3× přetrvává FS > 8 bodů

FS < 8 bodů

FS á 4 hod.

NE

ANO

zahájení farmakologické léčby dle návykové látky

OPIÁTOVÝ NAS

MORPHIN

Iničiální dávka: 0,03-0,1 mg/kg/dávku p.o.
frekvence: á 3 hod.
navyšovat o 0,02-0,04 mg/kg/dávku
až FS < 8

2-3 dny stejná dávka FS < 8

snížování o 0,1 mg/den á 1-2 dny
při minimální dávce prodloužit interval.

NEOPIÁTOVÝ NAS

PHENOBARBITAL

Iničiální dávka: 6-20 mg/kg/dávku p.o.
frekvence: á 6-8 hod.
navyšovat o 2 mg/kg/dávku až FS < 8

udržovací dávka 4-6 mg/kg/den
3-6 dnů stejná dávka FS < 8

snížování o 1 mg/kg/den á 3-5 dní
při minimální dávce prodloužit interval.