

POSTUP PŘI ŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ KOJENCŮ PO KONZUMACI KOJENECKÉ VÝŽIVY (ZÁVADNÉ A NEZÁVADNÉ ŠARŽE) URČENÝ PRO KHS

(Aktualizováno dle definice případu vydané ECDC)

1. Analýza stravovacích zvyklostí (prověření typu podávané stravy)
2. Prověření šarží (identifikace stažené vs. nestažené šarže)

1. KROK – ANALÝZA STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ

Je dítě krmeno výhradně kojeneckou výživou? (tzn. není kojeno a nemá příkrmy)

- **NE** – žádné nebo minimální riziko, doporučit vyšetření dítěte u PLDD, epid. šetření – sběr základních údajů pro případ dalšího šetření, u kombinace s příkrmy či kojením zjistit, zda je dodrženo dávkování
- **ANO** – pokračujte ke kroku č. 2

2. KROK – IDENTIFIKACE ŠARŽE VÝŽIVY

- **A) Jedná se o STAHOVANOU ŠARŽI (ANO):**

1. Doporučit vyšetření dítěte u PLDD za účelem vyloučení jiného agens.
2. Evidence případu v ISIN v kategorii „**PRAVDĚPODOBNÝ PŘÍPAD**“ pod dg.A05.4 – Intoxikace přenesená potravou, původce *Bacillus cereus*

- **B) Šarže NENÍ na seznamu stahovaných:**

1. Požádat o vyšetření kojenecké výživy (HV).
2. Evidence případu v ISIN v kategorii „**MOŽNÝ PŘÍPAD**“ pod dg. A05.4
3. Doporučit vyšetření dítěte u PLDD za účelem vyloučení jiného agens.

V případě prokázání cereulidu ve výživě – evidovat případ jako „POTVRZENÝ“ pod dg. A05.4.

MOŽNÝ PŘÍPAD: Kojenec s akutními gastrointestinálními příznaky, přičemž převládajícím příznakem je zvracení, ale může se vyskytnout i průjem, od října 2025 a dále, s nástupem prvních příznaků u kojence **do 8 hodin* po konzumaci jakéhokoliv kojeneckého mléka**, a při **absenci jiných GIT příznaků infekce v domácnosti** (2 dny před a 2 dny po nástupu

příznaků u kojence), a **při nezjištění jiných gastrointestinálních patogenů ve stolici kojence.**

PRAVDĚPODOBNÝ PŘÍPAD: Kojenec s akutními gastrointestinálními příznaky, přičemž převládajícím příznakem je zvracení, ale může se vyskytnout i průjem, od října 2025 a dále, **s nástupem prvních příznaků u kojence do 8 hodin* po konzumaci staženého kojeneckého mléka.**

POTVRZENÝ PŘÍPAD: Kojenec s akutními gastrointestinálními příznaky, přičemž převládajícím příznakem je zvracení, ale může se vyskytnout i průjem, od října 2025 a dále, s nástupem prvních příznaků u kojence **do 8 hodin* po konzumaci jakéhokoli kojeneckého mléka a detekcí cereulidu ve stolici dítěte nebo detekcí cereulidu ve stejné šarži kojeneckého mléka, jakou dítě konzumovalo.**

* 8 hod – při podezření na prodlouženou expozici, nemusí být inkubační doba přísným kritériem.

V modré hlášence nebo do poznámky v ISIN uveďte klinické příznaky, název mléka, šarži, ev. denní dávku, a zda bylo stahováno pro možnou kontaminaci.

Uveďte rovněž všechny **další zásadní informace** o případu, například zda se při vyšetření prokázala jiná agens.